استبيان الفحص السابق للتسجيل

رقم السؤال	سؤال الفحص	الإجراء الواجب اتخاذه
1.	<p>هل سبق وعانيت من رد فعل تحسسي شديد مهدد للحياة* (مثل التاق) لجرعة سابقة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19، أو لأي مكون من مكونات اللقاح (التي تتضمن غليكو بولي إيثيلين)؟</p> <p>أو</p> <p>هل سبق وعانيت من أي حالة رد فعل تحسسي أيًا كانت درجة شدتها خلال 4 ساعات من حصولك على جرعة سابقة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19، أو لأي مكون من مكونات اللقاح (التي تتضمن غليكو بولي إيثيلين)؟</p> <p>تشمل مكونات لقاح فايزر-بيونتك ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الحمض الريبي النووي المرسل (mRNA) • الدهون: ○ (4-هيدروكسي بوتيل) أزانيديل(مكرر) (هكسان-1،6-دييل)مكرر(2-هكسيل ديكانوات) ○ 2[(غليكو بولي إيثيلين)-2000]-نيتروجين، نيتروجين-ديتتراديسيل أسيتاميد ○ 1،2-ديستيريول-سن-غليسيرو-3-فوسفوكولين ○ كوليسترول • كلوريد البوتاسيوم • فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة • كلوريد الصوديوم • فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة ثنائي الهيدرات • سكروز 	<p>تجنب إعطاء لقاح فايزر-بيونتك أو مودرنا.</p>
	<p>نعم <</p> <p>لا <</p>	<p>تابع إلى السؤال رقم 2</p>
2.	<p>هل سبق وعانيت من رد فعل تحسسي شديد مهدد للحياة* (مثل التاق) لجرعة سابقة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19، أو لأي مكون من مكونات اللقاح (التي تتضمن غليكو بولي إيثيلين)؟</p> <p>أو</p> <p>هل سبق وعانيت من أي حالة رد فعل تحسسي أيًا كانت درجة شدتها خلال 4 ساعات من حصولك على جرعة سابقة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19، أو لأي مكون من مكونات اللقاح (التي تتضمن غليكو بولي إيثيلين)؟</p> <p>تشمل مكونات لقاح مودرنا ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الحمض الريبي النووي المرسل (mRNA) • الدهون: ○ SM-102 (خاص بشركة مودرنا) ○ غليكو بولي إيثيلين [PEG] 2000 ديميريستويل غليسيرو [DMG] ○ 1،2-ديستيريول-سن-غليسيرو-3-فوسفوكولين [DSPC] ○ كوليسترول • تروميثامين • هيدروكلوريد تروميثامين • حمض الأسيتيك • أسيتات الصوديوم • سكروز 	<p>تجنب إعطاء لقاح مودرنا أو فايزر-بيونتك.</p>
	<p>نعم <</p> <p>لا <</p>	<p>تابع إلى السؤال رقم 3</p>
3.	<p>هل سبق وعانيت من رد فعل تحسسي أيًا كانت درجة شدته خلال 4 ساعات من حصولك على بولي سوربات؟</p> <p>(ملاحظة: إن تركيبة بولي سوربات مماثلة لتركيبه غليكو بولي إيثيلين الذي يعد أحد مكونات الحمض الريبي النووي المرسل للقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا المضادين لكوفيد-19. وبالتالي، قد يكون الشخص المصاب بحساسية للبولي سوربات أكثر عرضة للإصابة برد فعل تحسسي لأحد هذين اللقاحين المضادين لكوفيد-19.)</p>	<p>تجنب إعطاء لقاح مودرنا أو فايزر-بيونتك.</p>
	<p>نعم <</p> <p>لا <</p>	<p>تابع إلى السؤال رقم 4</p>
4.	<p>هل سبق وعانيت من رد فعل تحسسي شديد مهدد للحياة* (مثل التاق) لأي شيء (بما في ذلك</p>	

<p>الأدوية الأخرى والأطعمة والمواد والتعرض البيئي وما إلى ذلك)؟ أو هل سبق وعانيت من رد فعل تحسسي أيًا كانت درجة شدته خلال أربع ساعات بعد حصولك على لقاح آخر أو علاج دوائي قابل للحقن (بما في ذلك الأدوية التي تُعطى بالحقن في الوريد أو العضلة أو تحت الجلد)؟</p>	
<p>بإمكان الشخص تحديد موعد الحصول على اللقاح، ولكننا نوصي بأن يقوم الشخص أولاً بمناقشة تاريخ إصابته بالحساسية ومخاطر اللقاح وفوائده المحتملة مع مقدم الرعاية الأولية. قَدِّم للشخص "معلومات حول لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة". عند حصولهم على اللقاح، سيخضعون للمراقبة لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم.</p>	<p>نعم <</p>
<p>تابع إلى السؤال رقم 5</p>	<p>لا <</p>
<p>5. هل تلقيت علاجًا بالأجسام المضادة السلبية لعلاج كوفيد-19 خلال الـ 90 يومًا السابقة (يشمل ذلك بلازما النقاهاة والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، مثل باملانيفاماب وكازيريفيماب/ إيمديفيماب)؟ (ملاحظة: ينبغي تجنب إعطاء لقاح كوفيد-19 لمدة 90 يومًا على الأقل بعد حصول الشخص على علاج بأجسام مضادة سلبية كعلاج لكوفيد-19، وذلك لتجنب احتمالية تدخل العلاج بالأجسام المضادة مع اللقاح.)</p>	
<p>لا تحدد موعدًا للحصول على اللقاح إلى أن ينقضي 90 يومًا على حصولك على العلاج بالأجسام المضادة السلبية.</p>	<p>نعم <</p>
<p>تابع إلى السؤال رقم 6</p>	<p>لا <</p>
<p>6. هل تلقيت لقاحًا آخر غير ذي صلة (مثل لقاح الأنفلونزا) خلال الـ 14 يومًا السابقة؟ (ملاحظة: ينبغي إعطاء لقاح كوفيد-19 وحده، وترك فترة فاصلة مدتها 14 يومًا على الأقل بينه وبين اللقاحات الأخرى.) < إذا كان الجواب نعم، ما هو تاريخ آخر تطعيم حصلت عليه بلقاح آخر؟ (أدخل التاريخ)</p>	
<p>لا تحدد موعدًا للحصول على اللقاح إلى أن ينقضي 14 يومًا على وقت اللقاح (اللقاحات) الأخر.</p>	<p>نعم <</p>
<p>تابع إلى السؤال رقم 7</p>	<p>لا <</p>
<p>7. هل تعاني من نقص المناعة الحاد** (هل جهازك المناعي ضعيف ولا يعمل بصورة سليمة)؟</p>	
<p>بإمكان الشخص تحديد موعد الحصول على اللقاح، ولكننا نوصي بأن يقوم الشخص أولاً بمناقشة الحالة المثبته للمناعة ومخاطر اللقاح وفوائده المحتملة مع مقدم الرعاية الذي يشرف على حالته. قَدِّم للشخص "معلومات حول لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة".</p>	<p>نعم <</p>
<p>تابع إلى السؤال رقم 8</p>	<p>لا <</p>
<p>8. هل أنت حامل في الوقت الحالي؟</p>	
<p>بإمكان المرأة تحديد موعد الحصول على اللقاح، ولكننا نوصي بأن تقوم المرأة أولاً بمناقشة الحمل ومخاطر اللقاح وفوائده المحتملة مع أخصائي التوليد. قَدِّم للشخص "معلومات حول لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة".</p>	<p>نعم <</p>
<p>النهاية</p>	<p>لا <</p>

* تتضمن ردود الفعل التحسسية الشديدة المهدة للحياة أعراض التآق مثل تورم الوجه أو الشفاه/اللسان أو الحلق؛ والأزيز أو صعوبة التنفس؛ وفقدان ضغط الدم المفاجئ وغير ذلك من الأعراض التي ينبغي معها إعطاء الشخص المصاب إيبينفرين.

** تتضمن حالات نقص المناعة الحاد تناول علاج كيميائي للسرطان، أو أن تكون قد تلقيت خلال عام واحد خلية جذعية دموية أو خضعت لزراعة عضو مصمت، أو أن تكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج حيث تقل عدد الخلايا للمفاوية CD4 في الدم عن 200، أو اضطراب العوز المناعي الأولي، أو ارتفاع مستويات الستيرويدات (مثل تناول أكثر من 20 ملجم من بريدنيزون في اليوم لأكثر من 14 يوم)، وغير ذلك.